



SIRET 852 260 892 00025

TVA intracommunautaire FR 40852260892

COMPTE RENDU CHIRURGICAL

Propriétaire

[REDACTED]

69000 LYON

Animal: Lasco
chow chow mâle

Référent

Soc. CLINIQUE VÉTÉRAIRE MERMOZVET
76 Rue Marius Berliet

69000 LYON

Date: 03/03/2022

ANAMNESE:

Arthrose sur les coudes secondaire à une maladie du compartiment médial (dysplasie du coude).

INTERVENTION CHIRURGICALE:

□ Anesthésie:

- Prémédication : Diazepam (0,2mg/kg) et Morphine (0,3mg/kg)
- Induction : Propofol (4mg/kg)
- Entretien : Isoflurane 2% sous 100% d'O₂
- Analgésie : Morphine (0,3 mg/kg)
- Fluidothérapie : Ringer Lactate 4ml/kg/h
- Anti-inflammatoires : Meloxicam (0,1mg/kg)
- Antibiothérapie : Ampicilline et Sulbactam (20 mg/kg)

□ Surveillance de l'anesthésie: Oxymétrie de pouls, Capnographie, Pression artérielle et ECG

□ Arthroscopie du coude :

- Abord médial du coude: Port scopique, Port instrumental, Voie d'Egress
- Synovite marquée
- Fragmentation de l'apex du processus coronoïde médial de l'ulna
- Présence de lésions cartilagineuses de type III à V (score Outerbridge) en regard du corps du processus coronoïde médial de l'ulna et de la partie médiale du condyle humérale (lésions en miroir)
- Absence de lésion cartilagineuse au niveau de la tête du radius
- Retrait du fragment et réalisation d'une coronoïdectomie partielle (apex) à l'aide d'une curette
- Rinçage articulaire abondant
- Sutures cutanées points en X monofilament irrésorbable (polyamide 2/0)
- Injection intra-articulaire de morphine

□ Ostéotomie ulnaire proximale bi-oblique :

- Abord latérale de l'ulna proximal
- Réalisation d'une ostéotomie ulnaire proximale bi-oblique
- Suture standard plan par plan
- Mise en place d'un bandage avec attelle

CONSIGNES POSTOPERATOIRES:

Restriction de l'activité pendant 2 à 3 mois:

- Promenade uniquement en laisse