

Dossier Médical

M CHOW AU COEUR
20 Rue Croix Saint Vincent
89340 VILLEBLEVIN
06 50 22 46 33
Référé par **Claire GIORDANO**

VETOEIL
77185 LOGNES
Imprimé le 09/06/2022

Nom	ROMY	Espèce	Chien	Sexe	Femelle	Né le	27/09/2020
Race	Chow-Chow	Poids	28.400 kg	Identification	250269590246081		

Consultation du 09/06/2022

Informations

Vu par : Éric DÉAN

Motif : Chirurgie cataracte OD

Observations :

Anesthésie: induction Dexdomitor et kétamine. Mise en place d'une voie veineuse. Intubation sonde et relais oxygène et isoflurane.
Monitoring cardio-respiratoire (ECG, FR, SPO2, EtCO2, CO2insp).
Injection Rilexine, Buprécare. Injection Métacam au réveil.
Membrane pupillaire sur les 2 yeux irido iriennes et irido cornéenne.
Chirurgie de l'oeil droit. Visulation d'un microphakie avec un colobome temporal du cristallin (confirme les malformation multiples liées à la microphthalmie).
Tonte des paupières et désinfection de la peau à la Vétédine pure et des culs-de-sac à la Vétédine diluée à 50%.
Chirurgie sous microscope opératoire.
Fixation du globe en 4 points avec une exposition difficile de l'oeil du fait de la petite taille.
Incision cornéenne au couteau calibré 3,2 mm à usage unique. Injection de visco élastique dans la chambre antérieure. Contre incision pour micromanipulateur de 1 mm au couteau à usage unique.
Capsulorrhexis antérieur. Emulsification du cristallin. Fermeture rapide de la pupille. Injection d'adrenaline dans la chambre antérieure ne permettant pas d'obtenir une dilatation complète.
Saignements iriens.
Nettoyage des masses à la sonde d'irrigation aspiration.
La capsule postérieure est fibrosée et opaque. rhexis postérieur à l'aiguille à rhexis à usage unique.
Vitrectomie au vitréotome à usage unique Alcon. Saignement à nouveau et pénétration dans le segment postérieur. Injection de visco élastique dans le segment postérieur et la chambre antérieure pour arrêter le saignement.
Retrait partiel du visco élastique.
Suture cornéenne au monofil résorbable 9/0. Injection dans la chambre antérieure d'une bulle d'air et de tPA.
Injection sous-conjonctivale de Kénacort retard.
PO: Rilexine, Prednicortone Localement: Mydriaticum, Maxidrol, Quinofree, Azarga.