CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TOURAINEVET
Exercice en référé exclusif

Chirurgie - Médecine interne - Imagerie médicale
Cardiologie - Dermatologie

02 46 99 08 90 www.tourainevet.fr

Date
20/10/26

Vétérinaire référent
DR BOURGOIN Berangere

Animal
Chien MAYA
Chow-Chow FS
Date de naissance : 1 JAN 16

Propriétaire
SOC ASSOCIATION CHOW AU COEUR
Lieu Dit le Jeunet Fleury
72500 LAVERNAT

Anamnèse :
Otite moyenne droite avec suspicion de cholestéatome. Absence de réponse positive au traitement médical et conservateur mis en œuvre. Décision de TECALBO droite.

Intervention chirurgicale :
Ablation totale du conduit auditif et ostéotomie latérale de la bulle tympanique droite
Abord du conduit auditif droit. Dissection le long du conduit cartilagineux. Préservation du nerf facial caudalement et latéralement. Section du conduit à la base de son attache osseuse. Ostéotomie de la bulle tympanique. Curetage du contenu de la bulle et nettoyage. Rinçage abondant. Fermeture conventionnelle par fils résorbables.
Envoi des prélèvements en analyse histologique pour la conduit auditif externe et le contenu de la bulle tympanique, et envoi en analyse bactériologique pour le contenu de la bulle tympanique.

Suivi :
Contrôle dans 5 jours chez votre vétérinaire
Contrôle dans 20 jours et retrait des points chez votre vétérinaire
Nous recontacter dans 10 jours pour discuter des résultats de l'analyse histologique et bactériologique.

Soins post-opératoires :
Exercice interdit pendant 2 semaines. Sortie en laisse courte uniquement, pour les besoins hygiéniques uniquement. Pas de vie en liberté, même dans un jardin clôturé.
Éviter le port d'un collier, privilégier un harnais.
Jeux, sauts, escaliers, courses, activité intense interdits pendant toute la durée de la convalescence.
Port de collerette obligatoire jusqu'au retrait des points

Pronostic :
Réservé dans les atteintes chroniques de l'oreille avec une suspicion de cholestéatome.
Les complications les plus fréquemment rencontrées sont la paralysie faciale (10 % des cas environ) et le syndrome de Claude Bernard Horner (plus fréquemment rencontré chez le chat que chez le chien). Les autres complications possibles sont la déhiscence de plaie, l'abcès, la récidive locale etc ...

En cas de dégradation de l'état général, d'abattement, ou d'anomalie … consulter votre vétérinaire traitant.

Prescription :
CLAVASEPTIN P 500 MG 10 CPS : Faire avaler 1 cp matin et soir pendant 10 jours
DERMIPRED 20 BT 10 CPS : Faire avaler 1/2 comprimé matin et soir pendant 10 jours.
TRALIEVE 70,3MG BT 10 CPS : Faire avaler 1 comprimé matin et soir pendant 5 jours

Dr Jean François BOURSIER
DMV, Dip. ECVS. DESV de chirurgie. Spécialiste en chirurgie

Dr Guillaume Reinsch
DMV, Résident de chirurgie